

CONDUITE AUTOMOBILE



Près de 50 % des survivants d'un AVC reprendront le volant, ce qui est souvent leur objectif principal.



Au Canada, les survivants d'un AVC devraient attendre au moins un mois avant de recommencer à conduire.

Les survivants ne doivent pas reprendre la conduite sans les conseils de leur équipe de traitement.

DÉPISTAGE

- Conduire est une tâche complexe qui fait appel à plusieurs aptitudes.
- Les symptômes sensori-moteurs et cognitivo-perceptuels de l'AVC liés à la conduite peuvent toucher :
 - **Les habiletés cognitives**, telles que les fonctions exécutives (jugement, contrôle des impulsions, résolution de problèmes et vitesse de prise de décisions).
 - **Les habiletés perceptuelles**, telles que la praxie, la perception spatiale et le traitement de l'information visuelle.
 - **Les fonctions visuelles**, telles que l'acuité, le champ de vision, la sensibilité au contraste et la récupération de l'éclat/ l'éblouissement.
 - **Les composantes linguistiques**, telles que la compréhension verbale et écrite.
 - **Les composantes physiques**, telles que la force, la coordination, le temps de réaction, la tolérance, la proprioception et la sensation.
- Le taux de récupération des symptômes varie.
- Il n'existe pas un seul outil d'évaluation de l'aptitude à reprendre le volant.

INTERVENTION



COMMUNICATION

Donner des informations cohérentes et concises et des messages clairs sur les objectifs et les étapes à suivre.



SOUTIEN

Envisager d'autres moyens de faciliter les déplacements dans la communauté pour ne pas nuire à la routine et à l'autonomie.



RECOMMANDATIONS

Après l'évaluation des capacités fonctionnelles du patient, en cas d'incertitude, demander l'évaluation complète de la capacité à conduire un véhicule automobile auprès d'un centre spécialisé.

Pour d'autres renseignements sur la capacité à conduire de votre patient, communiquez avec ces fournisseurs de soins suivants :

- médecin ou infirmière praticienne
- ergothérapeute
- optométriste